

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОДГОТОВКА К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Спирография, Спирография с бронхолитической пробой, Спирография при физической нагрузке

- За 2-3 часа до исследования - легкий прием пищи.
- За 1 час до исследования - не курить и не пить кофе.
- По рекомендации врача отмена препаратов: О2-агонисты короткого действия (сальбутамол, вентолин, беродуал, беротек, атровент) - за 4-6 часов до исследования; b2-агонисты пролонгированного действия (сальметерол, формотерол) - за 12 часов; пролонгированные теофиллины – за 23 часа; ингаляционные кортикостероиды (серетид, симбикорт, беклазон) – за 24 часа.
- Принести с собой амбулаторную карту.

Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер), Суточное мониторирование АД+ЭКГ (Холтер+СМАД)

- Принести с собой майку или футболку, амбулаторную карту и ЭКГ.
- Мужчинам побрить волосы на груди.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

- Принести с собой майку или футболку, амбулаторную карту и ЭКГ.

Электрокардиография с физическими упражнениями (Тредмил-тест - нагрузочная проба на беговой дорожке)

- За 12 часов до исследования исключить непривычные физические нагрузки.
- За 2-3 часа до исследования легкий прием пищи и не курить!
- При себе иметь спортивные брюки, легкие кроссовки.
- Принести с собой амбулаторную карту и ЭКГ.
- Обязательно при себе иметь направление от врача на данное исследование.

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца, Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца (повторное) с медикаментозной нагрузкой

- Проводится строго по назначению врача при отсутствии заболеваний пищевода!
- За 4 дня до исследования исключить приём медикаментов, влияющих на ритм сердца.
- Проводится натощак: за 6 часов - не принимать пищу, за 3 часа - не принимать жидкость.

Суточная рН-импедансометрия

- Принести с собой направление от лечащего врача и результат эзофагофиброгастродуоденоскопии (ЭГДС) сроком давности не более 3 мес.
- Исключить прием пищи за 12 часов до проведения исследования, приём жидкости за 4 часа.
- Отменить приём антацидных препаратов и холинолитиков за 12 часов, H2-блокаторов за 24 часа, ингибиторов протонной помпы за 7 дней до начала исследования.
- По поводу отмены препаратов - проконсультироваться с лечащим врачом.