

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОДГОТОВКА К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС), Трансназальная видеогастроскопия

- Обследование проводится на голодный желудок.
- Последний прием пищи за 8-10 часов до гастроскопии: пища в желудке затрудняет его осмотр и постановку правильного диагноза.
- При сильной жажде можно выпить не более 100 мл воды за 4-5 часов до обследования.
- После седации запрещено управлять автомобилем в течение суток.

ВидеокOLONOSКОПИЯ, Видеосигмоскопия

- За день до процедуры легкий завтрак до 9 утра, голод в течение всего дня. Пить разрешается.
 - В день исследования прием пищи и воды запрещен, принимать лекарства разрешается.
- При выраженном вздутии живота принимать «Эспумизан» (эмульсию) по 1-2 чайной ложке 3 раза в день. Активированный уголь использовать нельзя!
- При ощущении слабости, головокружения во время подготовки можно рассасывать карамель или мед. Твердую пищу есть нельзя!
 - Подготовку препаратом необходимо прекратить при выраженной гипертонии, рвоте, боли в животе.
 - Для облегчения приема препарата можно добавить в него сок цитрусовых.
 - Если вы запланировали выполнение колоноскопии под седацией, в день исследования прием пищи и воды строго запрещен.
 - Анализы, необходимые для седации: общий анализ крови; общий анализ мочи; ЭКГ (для возраста с 60 лет и для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой).
 - За 3 дня до исследования бесшлаковая диета: исключить пищу, богатую клетчаткой (фрукты и овощи, грибы и ягоды, зелень, бобовые, крупы, злаки, хлеб).
 - Препараты, используемые для подготовки: «Пикопреп» (2 пакета); «Мовипреп» (4 саше); «Фортранс» (4 пакета).
 - После седации запрещено управлять автомобилем в течение суток.

Эндоскопическая полипэктомия

- Подготовка к полипэктомии желудка аналогична подготовке к гастроскопии.
- Подготовка к полипэктомии кишечника аналогична подготовке к колоноскопии.
- Анализы, необходимы для проведения полипэктомии: общий анализ крови, группа крови, резус фактор, RW, ВИЧ, гепатит В и С; время кровотечения, время свертываемости; общий анализ мочи; ЭКГ.
- После седации запрещено управлять автомобилем в течение суток.
- Наличие кардиостимулятора является противопоказанием для проведения полипэктомии.
- При подготовке к полипэктомии в случае приема антикоагулянтов необходимо отменить прием препаратов за 1 неделю до процедуры.

Видеобронхоскопия диагностическая, Видеобронхоскопия лечебная

- Эндоскопическое исследование выполняется только натошак.
- Последний прием пищи должен быть не позднее 21 часа накануне дня исследования.
- В день исследования до процедуры ничего не ешьте и не пейте.
- Если Вам необходимо принимать лекарства, проконсультируйтесь с лечащим врачом о расписании приема в день исследования.

- Бронхоскопия занимает обычно 30-60 минут. Восстановление займет 2-3 часа.
- После процедуры: не ешьте и ничего не пейте в течение 2 часов; не садитесь за руль транспортного средства в течение 8 часов; не курите в течение 24 часов.
- Анализы, необходимые для бронхоскопии: общий анализ мочи; общий анализ крови; RW, ВИЧ, гепатит В и С; ЭКГ; рентгенография легких в двух проекциях; время кровотечения, время свертываемости; спирография.

Определение Хеликобактер на цифровом Хелик-аппарате

- Обследование должно проводиться утром натощак (последний прием пищи не позднее 22.00 часов накануне).
- Допускается употребление воды, но за час до обследования можно выпить не более 100 мл.
- Нельзя принимать некоторые лекарства (антибиотики и антисекреторные средства в течение 2 недель, противовоспалительные, антацидные препараты и анальгетики в течение 5 дней).
- Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течение 3 суток перед обследованием.
- Нельзя есть бобовые в течение суток перед обследованием.
- Отказаться от жевательной резинки за 3 часа до обследования.
- Не курить 3 часа до обследования.
- Обязательно почистить зубы и тщательно прополоскать рот.