

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Обзорная рентгенография брюшной полости, Рентгенография тонкого кишечника с контрастным веществом, Рентгеноконтроль пассажа бариевой взвеси по желудочно-кишечному тракту

- Проводится строго натощак

Рентгенография крестца и копчика

- Опорожнить прямую кишку перед исследованием.

Внутривенная экскреторная урография с омнипаком

- Необходим результат общего анализа мочи. Годен 10 дней.
- За 3-4 дня до обследования рекомендуется полноценное белковое питание, повышенный прием жидкости, лучше соки.
- По возможности ввести в рацион тертую редьку (редис, хрен), черноплодную рябину, изюм, грецкие орехи.
- Назначаются витамины А, С, В, Р, аскорбиновая кислота с глюкозой.
- При склонности к вздутию живота исключить продукты, богатые углеводами, употреблять настой ромашки; при склонности к запорам - очистительные клизмы.
- Исключить из рациона черный хлеб, молоко и молочные продукты, свежие овощи, лук, чеснок, кофе, газированные напитки.
- Накануне исследования резко ограничить прием жидкости, ужин исключается, на ночь очистительная клизма.
- Можно подготовиться без клизм с препаратом «Фортранс» (по аннотации).
- Утром в день исследования легкий завтрак (30-40 гр. белого хлеба, 20-30 гр. сливочного масла или сыра, рыба, творог, 0,5 стакана чая).
- До исследования избегать горизонтального положения, особенно на левом боку.
- Перед процедурой опорожнить мочевой пузырь.
- В день исследования отменить все физиотерапевтические процедуры.

Микционная цистоуретрография

- Процедуру проводить желательнее в первой половине дня натощак (пить можно).
- Необходим аллергологический анамнез (реакция на йодсодержащие препараты).
- Детям: результат общего анализа мочи (годен 10 дней), амбулаторная карта.
- Накануне легкий ужин, очистительная клизма или прием слабительного.
- Опорожнение мочевого пузыря непосредственно перед процедурой.
- Наблюдение в дневном стационаре после проведения процедуры не требуется.
- Обратит внимание пациента (родителей, если это ребенок) на то, что в течение дня после процедуры будут проблемы с мочеиспусканием (дискомфорт).