

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОДГОТОВКА К УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯМ

УЗИ органов пищеварения и брюшинного пространства:

- органов брюшной полости, брюшинного пространства
- почек и надпочечников
- печени и желчного пузыря
- поджелудочной железы
- селезенки
- желудка (в первой половине дня)
- Проводится натощак: не принимать пищу, не пить, не курить в течение 6-8 часов до исследования.
- За 2-3 дня исключить продукты, усиливающие газообразование в кишечнике: сырые овощи и фрукты, цельное молоко, газированные напитки и соки, черный хлеб, мучные и сладкие изделия, бобовые (горох, фасоль, чечевица, бобы, соя).

УЗИ печени с определением функции желчного пузыря

- Первое УЗИ проводится натощак.
- После первого УЗИ необходимо употребить 120 гр. сметаны (жирность не менее 15%). Это можно сделать в кафе клиники на 0 этаже.
- Через 40 минут после принятия пищи нужно подойти на второе УЗИ.

Дуплексное сканирование:

- брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей
- нижней полой вены и ее висцеральных ветвей
- вен портальной системы
- сосудов гепато-билиарной системы
- сосудов почек
- Проводится натощак, в первой половине дня.

УЗИ в гинекологии:

- матки и придатков
- фолликулогенеза
- Прийти с наполненным мочевым пузырем.
- За 1 час до исследования выпить 1 литр негазированной жидкости.

УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами

- Исследование проводится на 6-10 день менструального цикла.

УЗИ в урологии:

- мочевого пузыря (дети 0-3 лет без подготовки)
- почек и мочевого пузыря с функциональной нагрузкой (дети 0-3 лет без подготовки)
- простаты
- Прийти с наполненным мочевым пузырем.
- За 1-2 часа до исследования выпить 1 литр негазированной жидкости.
- Воздержание от мочеиспускания за 1 час до исследования.

ТРУЗИ простаты

- Накануне желательно опорожнить кишечник с помощью очистительной клизмы или утром естественным путем.

УЗИ вилочковой железы

- Родители должны знать точный вес ребенка перед исследованием.